

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

СЕПТИЛ ПЛЮС
(SEPTIL PLUS)

Склад:

діюча речовина: не менше 95,1 % і не більше 96,9 % етанолу за об'ємом.

Лікарська форма. Розчин.

Фармакотерапевтична група. Антисептичні та дезінфекційні засоби.
Код АТСD08A X08.

Клінічні характеристики.

Показання.

Для дезінфекції шкіри рук.

Противоказання.

Підвищена індивідуальна чутливість. Не можна застосовувати при гострих запальних процесах шкіри.
Дитячий вік 14 років.

Спосіб застосування та дози.

Зовнішньо – наносять на шкіру за допомогою ватних тампонів, серветок.

Побічні реакції.

При місцевому застосуванні – подразнення шкіри або слизових оболонок.
У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!

Передозування.

При зовнішньому застосуванні випадки передозування невідомі.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

У період вагітності і годування груддю застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

Діти.

Не застосовувати дітям віком до 14 років.

Особливі заходи безпеки..

У разі почервоніння і подразнення шкіри необхідно припинити застосування препарату і змити рідину водою.

Не допускати потрапляння препарату в очі!

Особливості застосування.

Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

При зовнішньому застосуванні етанолу результати взаємодії з іншими лікарськими засобами невідомі.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. При зовнішньому застосуванні чинить антисептичну, дезінфікуючу, місцеву подразнювальну дію. Етанол коагулює білки, активний відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій та вірусів. Чинить «дубильну» дію на шкіру та слизові оболонки.

Фармакокінетика. При місцевому застосуванні не всмоктується через шкіру.

Фармацевтичні характеристики:

Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна, летка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна.

Термін придатності.

Не обмежений.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 0С у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 100 мл у флаконах.

Категорія відпуску.

За рецептом.

Виробник. ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».

Місцезнаходження. Україна, 10014, Житомирська обл., місто Житомир, Корольовський район, вул. Лермонтовська, будинок 5.

**ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату**

**СЕПТИЛ ПЛЮС
(SEPTIL PLUS)**

Склад:

діюча речовина: не менше 95,1 % і не більше 96,9 % етанолу за об'ємом.

Лікарська форма. Розчин.

Фармакотерапевтична група. Антисептичні та дезінфекційні засоби.

Код АТСD08A X08.

Клінічні характеристики.

Показання.

Для дезінфекції шкіри рук.

Протипоказання.

Підвищена індивідуальна чутливість. Не можна застосовувати при гострих запальних процесах шкіри. Дитячий вік 14 років.

Спосіб застосування та дози.

Зовнішньо – наносять на шкіру за допомогою ватних тампонів, серветок.

Побічні реакції.

При місцевому застосуванні – подразнення шкіри або слизових оболонок.

У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря!

Передозування.

При зовнішньому застосуванні випадки передозування невідомі.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

У період вагітності і годування груддю застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.

Діти.

Не застосовувати дітям віком до 14 років.

Особливі заходи безпеки..

У разі почервоніння і подразнення шкіри необхідно припинити застосування препарату і змити рідину водою.

Не допускати потрапляння препарату в очі!

Особливості застосування.

Не слід порушувати правила застосування лікарського засобу, це може зашкодити здоров'ю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

При зовнішньому застосуванні етанолу результати взаємодії з іншими лікарськими засобами невідомі.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. При зовнішньому застосуванні чинить антисептичну, дезінфікуючу, місцеву подразнювальну дію. Етанол коагулює білки, активний відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій та вірусів. Чинить «дубильну» дію на шкіру та слизові оболонки.

Фармакокінетика. При місцевому застосуванні не всмоктується через шкіру.

Фармацевтичні характеристики:

Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна, летка, легкозаймиста рідина.

Гігроскопічна.

Термін придатності.

Не обмежений.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 0С у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 100 мл у флаконах.

Категорія відпуску.

За рецептом.

Виробник. ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».

Місцезнаходження. Україна, 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка, вул. Корольова, б. 4.