

**СЕПТЕФРИЛ®-ДАРНИЦЯ  
(SEPTEFRIL-DARNITSA)****Склад лікарського засобу:**

діюча речовина: decamethoxine

1 таблетка містить декаметоксину 0,2 мг;

допоміжні речовини: цукор кристалічний, кальцію стеарат.

**Лікарська форма.** Таблетки.

Таблетки білого або майже білого кольору, плоскоциліндричної форми, з рискою та фаскою.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця».

Україна, 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13.

**Фармакотерапевтична група.** Препарати, що застосовуються при захворюваннях горла. Різні антисептики. Код АТС R02A A20.

Діюча речовина препарату – декаметоксин – є четвертинною амонієвою сполукою та належить до групи катіонних поверхнево-активних речовин. Декаметоксин з'єднується з фосфатними групами ліпідів цитоплазматичної мембрани мікробної клітини, що призводить до порушення її проникності та руйнування.

Препарат має широкий спектр антимікробної дії. Активний відносно до *Staphylococcus spp.* (включаючи стійкі до пеніциліну штами *S. aureus*), *Streptococcus spp.*, *Stomatococcus spp.*, *Corynebacterium spp.* (включаючи *C. diphtheriae*), ентеробактерій, псевдомонад, спорових мікроорганізмів, найпростіших, дріжджоподібних грибів, особливо *Candida albicans*, дерматоміцетів, вірусів. Чинить бактерицидну, фунгіцидну та спороцидну дію, а також інактивує дифтерійний екзотоксин.

Препарат підвищує чутливість бактерій до антибіотиків.

Препарат не пригнічує специфічну та неспецифічну імунологічну реактивність організму людини.

**Показання для застосування.**

Місцеве лікування у складі комплексної терапії захворювань порожнини рота, глотки, гортані (фарингіт, ларингіт, тонзиліт, гінгівіт, пародонтит, стоматит, кандидоз слизової оболонки порожнини рота, початкова стадія ангіни).

Санация порожнини рота, глотки, носоглотки у носіїв патогенного стафілококу, дифтерійної палички, кандиди.

Профілактика інфекційних ускладнень після хірургічних втручань у порожнині рота, глотці, гортані.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до декаметоксину або до інших компонентів препарату.

**Належні заходи безпеки при застосуванні.**

Для підвищення концентрації препарату у слині під час розсмоктування препарату слід стримуватися від частого ковтання слини.

Препарат небажано одночасно застосовувати з різними видами полоскання ротової порожнини та зіву.

При застосуванні препарату довше 7 днів можуть виникати порушення балансу мікрофлори глотки.

До складу препарату входить цукор, що слід враховувати хворим на цукровий діабет.

**Особливі застереження.****Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Клінічні дані щодо безпеки застосування препарату у період вагітності або годування груддю відсутні. Препарат не слід застосовувати у період вагітності. При необхідності застосування годування груддю слід припинити.

**Здатність впливати на швидкість реакції ї при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.**

Не впливає.

**Діти.**

Клінічний досвід щодо безпеки та ефективності застосування препарату дітям відсутній.

**Спосіб застосування та дози.**

Після попереднього полоскання рота таблетку класти за щоку і тримати у порожнині рота до повного розсмоктування. Дорослим препарат призначають по 1 таблетці 4-6 разів на добу. Тривалість лікування не має перевищувати 7 днів. Приймати препарат необхідно після їди, потім протягом 1 години слід утриматися від вживання їжі та напоїв.

**Передозування.**

Даних щодо випадків передозування препаратом не надходило.

**Побічні ефекти.**

Алергічні реакції, у т. ч. шкірні висипання, шкірний свербіж.

Можлива гіперсалівація, що минає після розсмоктування таблетки.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

При одночасному застосуванні препарату антибіотиками та протимікробними засобами системної дії посилюється антибактеріальний ефект препарату.

**Термін придатності.** 3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.**

Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вищє 25 °С.

**Упаковка.**

По 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці; по 10 таблеток у контурних чарункових упаковках.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.