

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ГЛОДУ НАСТОЙКА
(CRATAEGI TINCTURA)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 1 флакон містить: настойки плодів глоду подрібнених (*Crataegi fructus*) (1:10) (екстрагент – етанол 70 %) – 25 мл або 100 мл.

Лікарська форма. Настойка.

Прозора рідина від червоноувато-жовтого до темно-червоного кольору.
Під час зберігання можливе випадання осаду.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПАТ «Фітофарм».

Україна, 84500, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Сибірцева, 2.

Фармакотерапевтична група.

Засоби, що застосовуються у кардіології. Код АТСС01Е В04.

Біологічно активні речовини, що містяться у плодах глоду (флавоноїди, холін, ацетилхолін, дубильні речовини, фітостерини, тритерпенові кислоти) посилюють кровообіг у коронарних судинах та судинах головного мозку, підвищують чутливість міокарда до серцевих глікозидів і зменшують його збудливість, що призводить до певного посилення скорочень серцевого м'яза.

Препарат добре всмоктується при прийомі внутрішньо. Ефект настає через 30 хвилин – 1 годину.

Показання для застосування.

Функціональні розлади діяльності серцево-судинної системи (нейроциркуляторна дистонія), а також як допоміжний лікарський засіб при легких формах порушень серцевого ритму (миготлива аритмія, пароксизмальна тахікардія).

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Виражена артеріальна гіпотензія і брадикардія.

Незалежні заходи безпеки при застосуванні.

Препарат не рекомендується застосовувати під час їжі, щоб уникнути взаємодії з компонентами їжі.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Протипоказане.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

На період лікування препаратом слід утримуватися від керування автотранспортом або роботи з іншими механізмами.

Діти.

Дітям віком до 12 років протипоказане застосування препарату.

Спосіб застосування та дози.

Приймати внутрішньо до їжі. Дорослим рекомендується приймати по 20 крапель настойки 3 рази на добу, дітям старше 12 років – із розрахунку 1 крапля на 1 рік життя 3 рази на добу до досягнення стабільного терапевтичного ефекту. Тривалість лікування визначається лікарем індивідуально.

Передозування.

Симптоми: зниження артеріального тиску, сонливість, брадикардія.

Лікування: припинення прийому препарату. Терапія симптоматична.

Побічні ефекти.

Нервова система: сонливість.

Серцево-судинна система: уповільнення серцевого ритму.

Імунна система: при індивідуальній підвищеній чутливості до компонентів препарату можливі алергічні реакції (у тому числі гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Препарат посилює дію серцевих глікозидів та антиаритмічних засобів. Застосування із солями алкалоїдів не рекомендується у зв'язку з можливістю утворення негативних комплексів. Не слід застосовувати препарат разом з цизапридодом. Глоду настойка може посилювати дію снодійних, седативних, гіпотензивних засобів.

Термін придатності.

4 роки

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 25 мл або по 100 мл у флаконах.

Категорія відпуску.

Без рецепта.