

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

ГАСТРИКУМЕЛЬ
(GASTRICUMEEL®)

Склад:

діючі речовини: 1 таблетка містить: Acidum arsenicosum D6 – 30 мг, Argentum nitricum D6 – 30 мг, Carbo vegetabilis D6 – 60 мг, Pulsatilla pratensis D4 – 60 мг, Stibium sulfuratum nigrum D6 – 60 мг, Strychnos nux-vomica D4 – 60 мг;

допоміжні речовини: магнію стеарат, лактоза моногідрат.

Лікарська форма. Таблетки.

Основні фізико-хімічні властивості: круглі плоскі таблетки з фаскою, від білого до жовто-білого кольору, без запаху.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Фармакологічні властивості. Препарат чинить протизапальну, антиспастичну, седативну, гемостатичну, гастропротекторну дію, яка базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного та мінерального походження, які входять до складу препарату.

Клінічні характеристики.

Показання.

У комплексному лікуванні при гострому хронічному гастриті, печії, метеоризмі.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Особливі заходи безпеки.

Препарат містить лактозу, тому пацієнти з рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не повинні застосовувати препарат.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Токсичність у період вагітності та годування груддю гомеопатично розведених речовин, що входять до складу даного лікарського засобу, не встановлена. Жодних небажаних реакцій не виявлено.

Питання про доцільність застосування препарату вагітними та жінками, які годують груддю, вирішує лікар індивідуально, з урахуванням співвідношення ризик/користь через недостатність задокументованого досвіду застосування.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

Разова доза.

Дорослим та дітям віком від 12 років – 1 таблетка під язик (до повного розсмоктування).

Дітям віком до 12 років – 1 таблетку розтерти в порошок і, ретельно перемішуючи, розчинити у 20 мл (4 чайні ложки) кип'яченої води кімнатної температури та приймати разову вікову дозу: дітям віком від 2 до 6 років – 2 чайні ложки приготованого розчину, дітям віком від 6 до 12 років – 3 чайні ложки (залишки розчину зберігати у захищеному від світла місці при кімнатній температурі не більше однієї доби).

Разову вікову дозу приймати 3 рази на добу за 15-20 хвилин до їди або через годину після.

У разі гострого початку захворювання.

Дорослим та дітям віком від 12 років приймати 1 таблетку кожні 30-60 хвилин, до 12 разів на добу; дітям віком від 2 до 6 років – разову вікову дозу кожні 30-60 хвилин, до 6 разів на добу; дітям віком від 6 до 12 років – разову вікову дозу кожні 30-60 хвилин, до 9 разів на добу до усунення симптомів. Далі перейти на прийом 3 рази на добу.

Курс лікування – 2-4 тижні.

Діти.

Дітям віком до 2 років застосування препарату протипоказане.

Передозування.

Не відзначалося.

Побічні реакції.

Можливі алергічні реакції.

Термін придатності. 5 років.

Термін придатності визначає застосування препарату до останнього дня місяця.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Закривати контейнер із таблетками негайно після застосування, захищати від вологи.

Зберігати у недоступному для дітей місці!

Несумісність. Невідома.

Упаковка. Поліпропіленовий контейнер на 50 таблеток у картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник.

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмБХ/

Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина/

Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.