

І Н С Т Р У К Ц І Я
для медичного застосування препарату
АНГІН-ХЕЕЛЬ С
(ANGIN-HEEL® S)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 таблетка містить: Apis mellifica D4 – 30 мг, Arnica montana D4 – 30 мг, Atropa bella-donna D4 – 60 мг, Hepar sulfuris D6 – 60 мг, Hydrargyrum bicyanatum D8 – 30 мг, Phytolacca americana D4 – 30 мг, Solanum dulcamara D4 – 60 мг;

допоміжні речовини: магнію стеарат, лактоза моногідрат.

Лікарська форма. Таблетки.

Круглі, плоскі з фаскою, від білого до жовто-білого кольору, без запаху.

Назва і місцезнаходження виробника.

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ.

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина/

Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Препарат має протизапальну, антисептичну, дезінтоксикаційну дію, які базуються на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного, мінерального та тваринного походження, які входять до складу препарату.

Показання для застосування.

Ангіни різної етіології. Загострення хронічного тонзиліту. Тонзилогенна інтоксикація та ускладнення, що виникли внаслідок хронічного тонзиліту (у тому числі ревматичний міокардит та поліартрит, нефрит).

Протипоказання.

Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату, до рослин родини айстрових (складноцвітих).

Належні заходи безпеки при застосуванні.

Препарат містить лактозу, тому пацієнтам з рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не слід застосовувати препарат.

При утримуванні симптомів чи погіршенні стану необхідно проконсультуватися з лікарем.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Питання про доцільність застосування препарату вагітним та жінкам, які годують груддю, лікар вирішує індивідуально.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Невідома.

Діти. Препарат рекомендований для застосування дітям віком від 1 року.

Спосіб застосування та дози.

Разова доза дорослим і дітям від 6 років – 1 таблетка під язик (до повного розсмоктування).

Для застосування дітям віком до 6 років 1 таблетку розтерти в порошок і, ретельно перемішуючи, розчинити у 20 мл (4 чайні ложки) кип'яченої води кімнатної температури.

Разова вікова доза дітям від 1-го до 3-х років – 2 чайні ложки, дітям від 3-х до 6-ти років – 3

чайні ложки (залишки розчину зберігати у захищеному від світла місці при кімнатній температурі не більше 1 доби).

Приймати 3 рази на добу за 15-20 хвилин до їди або через годину після їди. У разі гострого початку захворювання приймати разову вікову дозу кожні 15 хвилин протягом перших 2-х годин. Далі перейти на прийом 3 рази на добу.

Курс лікування – 1-3 тижні.

Після одужання рекомендується продовжити прийом препарату 2 рази на добу ще протягом 3-5 днів з метою профілактики ускладнень.

Передозування.

Не відзначалося.

Побічні ефекти.

Алергічні реакції або підвищене слиновиділення можуть спостерігатися за рахунок гомеопатичної діючої речовини *Hydrargyrum bicusyanatum* (ртуть). У таких випадках необхідно припинити застосування препарату та проконсультуватися з лікарем.

У поодиноких випадках у осіб із гіперчутливістю до рослин родини айстрових (наприклад *Arnica*) чи до інших компонентів препарату можуть спостерігатися алергічні реакції, включаючи шкірні висипання, свербіж.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома. За призначенням лікаря препарат можна комбінувати з іншими лікарськими засобами та методами лікування.

Термін придатності.

5 років.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

Поліпропіленовий контейнер на 50 таблеток у картонній коробці.

Категорія відпуску.

Без рецепта.