

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ЖОВЧ МЕДИЧНА КОНСЕРВОВАНА
(CHOLE MEDICATE CONSERVATA)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: жовч великої рогатої худоби і свиней;

100 мл розчину містять: жовчі великої рогатої худоби і свиней – 88,85 мл;

допоміжні речовини: етанол 96 %, формалін, розчин фурациліну у 70 % спирті (1:1500), віддушка.

Лікарська форма.

Розчин нашкірний.

Рідина від жовто-коричневого до темно-коричневого кольору з зеленуватим відтінком або від світло-зеленого до темно-зеленого кольору з коричнюватим відтінком, із специфічним запахом. Допускається наявність пластівчастого або дрібнозернистого осаду.

Назва і місцезнаходження виробника.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фарма Черкас», Україна, 18007, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Сурікова, буд. 14А.

Фармакотерапевтична група.

Засоби, що застосовуються місцево при суглобному та м'язовому болях. Код АТС М02А Х10.

Препарат чинить протизапальний, знеболювальний, розсмоктувальний та емульгуючий ефекти.

Показання для застосування.

Спондилоартрози та спондилоартрити, гострі та хронічні артрози, артрити, бурсити, тендовагініти, вторинні радикуліти, п'яткові «шпори».

Препарат також застосовують при забиттях, розтягненні зв'язок, м'язів, підшкірних гематомах, станах після переломів кісток без порушення цілісності м'яких тканин, при фантомному болю після ампутації кінцівок, рубцевих змінах шкіри.

Протипоказання.

Порушення цілісності шкірних покривів, запальний процес шкіри та підшкірної клітковини в ділянці аплікації, гнійничкові захворювання шкіри, лімфаденіти, лімфангоїти, бешиха.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

При накладанні компресів недопустимо використовувати поліетилен, нейлон та інші синтетичні матеріали.

У разі подразнення шкіри жовчю і при необхідності продовження застосування препарату тривалість аплікації становить 6-10 годин на добу.

Після зняття компресу уражену ділянку помити теплою водою і змастити індиферентною маззю.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Досвід застосування препарату у період вагітності або годування груддю відсутній.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Досвід застосування препарату при лікуванні дітей відсутній.

Спосіб застосування та дози.

Препарат застосовують у схемах комплексної терапії разом з іншими лікарськими засобами.

Застосовувати зовнішньо (перед застосуванням збовтати) у вигляді компресів. Жовчю просочити 2-6 шарів марлі, накласти на ділянку ураження, накрити тонким шаром вати і воскованим папером, а потім зафіксувати тонкою пов'язкою. При висиханні марлеву серветку зволожити водою кімнатної температури і знову зафіксувати пов'язкою. Тривалість аплікації компресу - 24 години. Зміну компресів здійснювати щоденно, як і зміну фіксуючої пов'язки. Залежно від характеру та вираженості захворювання курс лікування становить 6-30 днів. Повторні курси – через 1-2 місяці.

Передозування.

Немає даних щодо передозування препаратом.

Побічні ефекти.

Подразнення шкіри. При вираженому вказаному ефекті застосування препарату відмінюють. У таких випадках наступне застосування препарату можливе не раніше, ніж через 15-30 діб.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Немає даних щодо взаємодії з іншими лікарськими засобами.

Термін придатності.

2 роки 6 місяців.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 250 мл у пляшці, по 1 пляшці у пачці; по 200 мл у флаконі, по 1 флакону у пачці; по 100 мл у флаконі або банці, по 1 флакону або банці у пачці

Категорія відпуску. Без рецепта.