

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ВАЗЕЛІН

Склад лікарського засобу:
діюча речовина: вазелін.

Лікарська форма. Мазь.

Напівпрозора, м'яка на дотик маса білого або майже білого кольору, у розплавленому стані злегка флуоресціює при денному світлі.

Назва і місцезнаходження виробника. ПрАТ Фармацевтична фабрика «Віола».
69063, м. Запоріжжя, вул. Кірова, 75.

Фармакотерапевтична група. Засоби з пом'якшувальною та захисною дією. Код АТCD02А С.
Вазелін – очищена суміш твердих та рідких вуглеводнів, які одержують із нафти. Вазелін має пом'якшувальний вплив на шкіру.
При зовнішньому застосуванні вазелін практично не абсорбується у системний кровоток.

Показання для застосування. Для пом'якшення шкіри рук та обличчя, у тому числі після впливу на шкіру несприятливих температурних факторів.

Протипоказання. Індивідуальна підвищена чутливість до препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні. У разі необхідності після аплікації Вазелін витирати ватним або марлевым тампоном і змивати теплою водою з милом.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Немає протипоказань.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Немає протипоказань.

Спосіб застосування та дози. Вазелін застосовують зовнішньо. У невеликій кількості наносити на необхідну ділянку шкіри і легко втирати.

Передозування. Невідоме.

Побічні ефекти. У осіб з підвищеною чутливістю можливе подразнення, алергічні реакції.

Взаємодія з лікарськими засобами та інші види взаємодій. Як індиферентна речовина, Вазелін не взаємодіє з іншими лікарськими засобами.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання. Зберігати у недоступному для дітей місці при температурі не вище +25 °С. Не допускається заморожування.

Упаковка. Контейнери по 25 г або 50 г, туби по 25 г.

Категорія відпуску. Без рецепта.