

# ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування препарату

## РОТОКАН

### Склад лікарського засобу на один флакон:

**діюча речовина:** діюча речовина: екстракт рідкий (1:1) із лікарської рослинної сировини: ромашки квіток (flores chamomile), нагідок квіток (flores calendulae), деревію (herba millefolii) (2:1:1).

**допоміжна речовина:** етанол (96 %), вода очищена.

**Лікарська форма.** Екстракт рідкий.

Рідина темно-бурого кольору з оранжевим відтінком, зі специфічним запахом. При зберіганні допускається утворення осаду.

### Назва і місцезнаходження виробника.

ПАТ «Лубнифарм».

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Петровського, 16.

### Фармакотерапевтична група.

Засоби, що впливають на травну систему і метаболізм. Препарати, що застосовуються у стоматології.

Код АТС А01А D11.

Комбінований рослинний препарат, дія якого зумовлена фізіологічно активними речовинами, які входять до його складу, чинять протизапальну, протимікробну та спазмолітичну дію, а також знижують проникність капілярів, посилюють і прискорюють процеси регенерації слизових оболонок (покращують трофічні процеси) і мають помірні гемостатичні властивості.

Препарат позитивно впливає на трофіку слизової оболонки шлунка, чинить спазмолітичну дію.

Ротокан чинить ранозагоювальну та антиоксидантну дію.

### Показання для застосування.

Застосовують у стоматологічній практиці при запальних захворюваннях слизової оболонки порожнини рота (афтозний та інші стоматити, виразково-некротичний гінгівостоматит).

Ротокан входить до складу комбінованої терапії при лікуванні захворювань органів травлення (хронічних гастритів, дуоденітів, функціональної диспепсії, хронічних колітів).

### Протипоказання.

Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Дитячий вік до 12 років.

### Належні заходи безпеки при застосуванні.

Без консультації лікаря не застосовувати препарат довше встановленого терміну. Якщо ознаки захворювання не почнуть зникати або ж навпаки – стан здоров'я погіршився, з'явилися небажані явища, потрібно звернутися до лікаря за консультацією щодо подальшого застосування препарату.

### Особливі застереження.

#### **Застосування у період вагітності або годування груддю.**

У період вагітності або годування груддю препарат застосовують лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує можливий ризик для плода або дитини.

#### **Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.**

Не досліджувалася.

### Діти.

Дітям віком до 12 років препарат не застосовують.

**Спосіб застосування та дози.**

Перед застосуванням дорослим та дітям віком старше 12 років 1 чайну ложку (5 мл) Ротокану розчиняють в 1 склянці теплої води.

Пародонтоз лікують місцево після видалення зубних відкладень та інструментальної обробки патологічних ясенних кишень. У ясеневі кишеньки вводять на 20 хвилин тонкі турунди, добре змочені приготовленим розчином препарату. Процедуру проводять щоденно або через день (4-6 разів).

При стоматитах та інших захворюваннях слизової оболонки порожнини рота препарат призначають у вигляді аплікацій із приготовленого розчину препарату тривалістю 15-20 хвилин або ротових ванночок з такого ж розчину тривалістю 1-2 хвилини. Застосовують 2-3 рази на добу протягом 2-5 днів.

У гастроентерології Ротокан застосовують внутрішньо та у мікроклізмах.

Внутрішньо застосовують по ½ - 1/3 склянки розчину з розрахунку 1 чайна ложка Ротокану на 1 склянку теплої кип'яченої води за 30 хвилин до їди або через 40-60 хвилин після їди, 3-4 рази на добу.

Для мікроклізм: 1 чайна ложка препарату на 50-100 мл теплої кип'яченої води (після очищення кишечника) 1-2 рази на добу. Курс лікування становить 15-20 днів. Тривалість застосування препарату залежить від досягнутого терапевтичного ефекту та перебігу захворювання.

**Передозування.**

Випадки передозування не описані.

**Побічні ефекти.**

В осіб з підвищеною чутливістю можливі алергічні реакції, почервоніння шкіри, висипання, свербіж, кропив'янка, ангіоневротичний набряк, анафілактичний шок.

У разі виникнення будь-яких негативних реакцій обов'язково порадьтеся з лікарем щодо подальшого застосування препарату.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Невідома.

**Термін придатності.** 3 роки.**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 8 °С до 15 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 55 мл або 110 мл у флаконах.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.