

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

ПІМАФУЦИН®
(PIMAFUCIN®)

Склад:

діюча речовина: natamycin;

1 г крему містить 20 мг натаміцину;

допоміжні речовини: децил олеат, воску цетилового ефір, спирт цетостеариновий, натрію лаурилсульфат, метилпарагідроксibenзоат (E 218), пропілпарагідроксibenзоат (E 216), пропіленгліколь, вода очищена.

Лікарська форма. Крем.

Основні фізико-хімічні властивості: крем від білого до жовтуватого кольору.

Фармакотерапевтична група. Протигрибкові препарати для місцевого застосування. Антибіотики. Код АТХ D01A A02.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Натаміцин є поліеновим антибіотиком. Його антимікотичні властивості пов'язані з порушенням цілісності клітинних мембран при взаємодії на рівні синтезу стеролів. До натаміцину чутлива більшість патогенних грибів. *Candida albicans* чутлива до натаміцину.

Фармакокінетика.

Натаміцин активний при місцевому застосуванні та не абсорбується через шкіру і мембрани слизових оболонок.

Клінічні характеристики.

Показання. Грибкові ураження шкіри, спричинені *Candida albicans*.

Протипоказання. Гіперчутливість до будь-якого компонента препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Препарат можна застосовувати у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не впливає.

Спосіб застосування та дози. Крем наносити на уражені ділянки шкіри 1-4 рази на добу щоденно. Тривалість терапії зазвичай становить 2-3 тижні.

Діти. Натаміцин у лікарській формі крем застосовувати дітям усіх вікових категорій.

Передозування. Симптоми передозування невідомі.

Побічні реакції.

Система організму	Рідкі ($\geq 1/10\ 000$ - $< 1/1000$)
Загальні розлади і зміни у місці застосування:	реакції гіперчутливості, відчуття печіння, подразнення.

Реакції гіперчутливості, у місці нанесення може виникати деяке подразнення або відчуття печіння.

Якщо вони тривають, це може бути наслідком гіперчутливості до консервантів (парагідроксибензоати). Наявність у складі препарату метилпарагідроксибензоату та пропілпарагідроксибензоату може спричинити алергічні реакції (можливо відтерміновані).

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 30 г у тубі, по 1 тубі у картонній пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник. Теммлер Італія С.р.л./ Temmler Italia S.r.l.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності. Via delle Industrie, 2, 20061, Каругате (MI), Італія / Via delle Industrie, 2, 20061 Carugate (MI), Italy.