

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування лікарського засобу**

**НОРМОВЕН**  
**(NORMOVEN)**

**Склад:**

*діюча речовина:* 1 таблетка містить флавоноїдної фракції 500 мг, яка містить діосмін 450 мг, гесперидину 50 мг;

*допоміжні речовини:* натрію крохмальгліколят (тип А), целюлоза мікрокристалічна, гідроксипропілметилцелюлоза, циклодекстрин, магію стеарат;

*оболонка:* суміш для плівкового покриття Opadry II Yellow (гідроксипропілметилцелюлоза; лактоза, моногідрат; поліетиленгліколь; триацетин; хіноліновий жовтий (Е 104); титану діоксид (Е 171); індигокармін (Е 132); жовтий захід FCF (Е 110)).

**Лікарська форма.** Таблетки, вкриті плівковою оболонкою.

*Основні фізико-хімічні властивості:* таблетки круглої форми з двоопуклою поверхнею, вкриті плівковою оболонкою від жовтого до коричнювато-жовтого кольору

**Фармакотерапевтична група.** Капіляростабілізуючі засоби. Біофлавоноїди. Діосмін, комбінації. Код АТХ С05С А53.

**Фармакологічні властивості.**

*Фармакокінетика.*

Нормовен чинить венотонічну та ангіопротекторну дію, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен і веностаз, поліпшує мікроциркуляцію, зменшує проникність капілярів і підвищує їх резистентність, поліпшує лімфатичний дренаж, збільшуючи лімфатичний відтік.

Лікарський засіб також зменшує взаємодію лейкоцитів та ендотелію, адгезію лейкоцитів у посткапілярних венулах. Це знижує пошкоджувальну дію медіаторів запалення на стінки вен і стулки клапанів вен.

*Фармакокінетика.*

Період напіввиведення лікарського засобу становить 11 годин.

Виведення діючої речовини відбувається головним чином через кишечник. Через сечу виводиться в середньому 14 % застосованої дози.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Симптоматичне лікування венолімфатичної недостатності (важкість у ногах, біль, набряки).

Симптоматичне лікування геморою.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Досліджень щодо взаємодій не проводили. Про взаємодію з іншими лікарськими засобами дотепер не повідомлялося (беручи до уваги великий постстресційний досвід застосування лікарського засобу).

**Особливості застосування.**

Застосування даного лікарського засобу при гострому геморой не замінює специфічного лікування та не перешкоджає лікуванню інших проктологічних захворювань. У разі, якщо упродовж короткого курсу лікування симптоми не зникають швидко, слід провести проктологічне обстеження та переглянути терапію.

При порушеннях венозного кровообігу більш ефективно лікування забезпечується поєднанням терапії з дотриманням таких рекомендацій щодо способу життя:

- слід уникати тривалого перебування на сонці, довготривалого перебування на ногах, надлишкової маси тіла;

- слід ходити пішки та у деяких випадках носити спеціальні панчохи для покращення кровообігу.

*Застосування у період вагітності і або годування груддю.*

Вагітним жінкам лікарський засіб слід застосовувати з обережністю. Перед застосуванням слід проконсультуватися з лікарем.

Відомо, що комбінація активних речовин, що входять до складу лікарського засобу, не виявляє тератогенної дії; про побічні ефекти не повідомлялося.

Через відсутність даних щодо проникнення лікарського засобу у грудне молоко застосування лікарського засобу у період годування груддю слід уникати.

Наявні дані свідчать про відсутність впливу активних речовин на фертильність пацієнтів.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Лікарський засіб не впливає на здатність керувати транспортними засобами та працювати з різними механізмами. Слід дотримуватися обережності у разі появи ознак побічної дії лікарського засобу (див. розділ «Побічні реакції»).

**Спосіб застосування та дози.**

Для перорального застосування.

Призначати дорослим.

*Лікування венолімфатичної недостатності* (симптоми: набряки, біль, важкість у ногах, нічні судороги, трофічні виразки, лімфедема)

Рекомендована доза становить 2 таблетки на добу: 1 таблетка – вдень та 1 таблетка – ввечері, під час їди. Після тижня застосування можна приймати 2 таблетки на добу одноразово під час їди.

*Лікування хронічного геморою*

По 2 таблетки на добу (у два прийоми) під час їди. Після тижня застосування можна приймати 2 таблетки на добу одноразово під час їди.

*Лікування гострого геморою*

По 6 таблеток на добу упродовж 4 днів, потім по 4 таблетки на добу протягом наступних 3 днів. Застосовувати під час їди. Добову кількість таблеток розподілити на 2-3 прийоми.

*Курс лікування*

Тривалість лікування залежить від показання до застосування та перебігу захворювання. Середня тривалість лікування становить 2-3 місяці.

*Діти.*

Дані щодо застосування лікарського засобу Нормовен дітям відсутні.

**Передозування.**

Про випадки передозування не повідомлялося.

**Побічні реакції.**

*З боку нервової системи:* запаморочення, головний біль, нездужання.

*З боку шлунково-кишкової системи:* діарея, диспепсія, нудота, блювання; коліт.

*З боку шкіри і нігтьової клітковини:* висипання, свербіж, кропив'янка; ізольований набряк обличчя, губ, повік. У виняткових випадках □ набряк Квінке.

Через вміст у складі лікарського засобу жовтого заходу FCF можливі алергічні реакції.

**Термін придатності.** 2 роки.

**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** По 10 таблеток у блістері. По 3 або 6 блістерів у паці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник.** ПАТ «Київський вітамінний завод».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

04073, Україна, м. Київ, вул. Копилівська, 38.

Web-сайт: www.vitamin.com.ua.