

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування лікарського засобу**

**ДОРМІКІНД**  
**(DORMIKIND®)**

**Склад:**

*діючі речовини:* 1 таблетка містить *Suipriedium pubescens D4* 15 мг; *Magnesium carbonicum D10* 20 мг; *Zincum valerianicum D12* 15 мг;

*допоміжні речовини:* мікрокристалічна целюлоза, тальк, лактози моногідрат, магнію стеарат.

**Лікарська форма.** Таблетки.

*Основні фізико-хімічні властивості:* білого або майже білого кольору двошарові таблетки зі скошеною кромкою.

**Фармакотерапевтична група.** Комплексний гомеопатичний препарат.

**Фармакологічні властивості.**

Активні компоненти препарату ефективні при таких симптомах як нервозність, дратівливість, відчуття тривожності.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Стани занепокоєння, збудження та безсоння.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Невідома.

Застосування даного гомеопатичного лікарського засобу не виключає застосування інших лікарських засобів.

**Особливості застосування.**

При застосуванні гомеопатичних лікарських засобів можливе тимчасове первинне погіршення. У цьому випадку слід припинити прийом препарату і проконсультуватися з лікарем.

Препарат містить лактозу. Пацієнтам із рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не слід застосовувати препарат. При відсутності поліпшення після 2-3 тижнів лікування або при частому повторенні симптомів слід припинити прийом препарату і проконсультуватися з лікарем.

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Препарат призначений для застосування дітям.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.*

Препарат призначений для застосування дітям.

**Спосіб застосування та дози.**

Дітям від народження до 6 років: по 1 таблетці 4 рази на добу.

Курс лікування: 2-4 тижні.

Таблетки слід приймати за 30 хвилин до або через 30 хвилин після їжі, повільно розсмоктуючи їх у ротовій порожнині. При лікуванні немовлят таблетки можна розчинити у невеликій кількості води (наприклад, у чайній ложці).

*Діти.* Препарат призначають дітям від народження до 6 років.

**Передозування.** У випадках передозування можливе підвищення частоти виникнення побічних реакцій.

**Побічні реакції.** Можливі алергічні реакції. При виникненні будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

**Термін придатності.** 5 років.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.** Зберігати при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** По 150 таблеток у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник.**

Дойче Хомеопаті-Уніон ДХУ-Арцнайміттель ГмбХ & Ко. КГ/  
Deutsche Homoeopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG.

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.**

Ottostrasse 24, 76227 Карлсруе, Німеччина/  
Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Germany.

## **ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению лекарственного средства**

### **ДОРМИКИНД (DORMIKIND®)**

**Состав:**

*действующие вещества:* 1 таблетка содержит Cypripedium pubescens D4 15 мг; Magnesium carbonicum D10 20 мг; Zincum valerianicum D12 15 мг;

*вспомогательные вещества:* микрокристаллическая целлюлоза, тальк, лактозы моногидрат, магния стеарат.

**Лекарственная форма.** Таблетки.

*Основные физико-химические свойства:* белого или почти белого цвета двухплоскостные таблетки со скошенной кромкой.

**Фармакотерапевтическая группа.** Комплексный гомеопатический препарат.

**Фармакологические свойства.**

Активные компоненты препарата эффективны при таких симптомах как нервозность, раздражительность, чувство тревожности.

**Клинические характеристики.**

**Показания.**

Состояния беспокойства, возбуждения и бессонница.

**Противопоказания.**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.** Неизвестно.

Применение данного гомеопатического лекарственного средства не исключает применение других лекарственных средств.

### **Особенности применения.**

При применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное первичное ухудшение. В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. Препарат содержит лактозу. Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат.

При отсутствии улучшения после 2-3 недель лечения или при частом повторении симптомов следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

*Применение в период беременности или кормления грудью.*

Препарат предназначен для применения детям.

*Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.*

Препарат предназначен для применения детям.

### **Способ применения и дозы.**

Детям от рождения до 6 лет: по 1 таблетке 4 раза в сутки.

Курс лечения: 2-4 недели.

Таблетки следует принимать за 30 минут до или через 30 минут после еды, медленно рассасывая их в полости рта. При лечении грудных детей таблетки можно растворить в небольшом количестве воды (например, в чайной ложке).

*Дети.* Препарат назначают детям от рождения до 6 лет.

**Передозировка.** В случаях передозировки возможно повышение частоты возникновения побочных реакций.

**Побочные реакции.** Возможны аллергические реакции.

При возникновении любых нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

**Срок хранения.** 5 лет.

Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

**Условия хранения.** Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.

**Упаковка.** По 150 таблеток во флаконе; по 1 флакону в картонной коробке.

**Категория отпуска.** Без рецепта.

### **Производитель.**

Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ/  
Deutsche Homoeopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG.

### **Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.**

Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруэ, Германия/  
Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Germany.