

## ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування препарату

### Стрепсілс<sup>®</sup> з Медом та Лимоном (Strepsils<sup>®</sup> Honey & Lemon)

#### Склад лікарського засобу:

*діючі речовини:* 2,4-дихлорбензиловий спирт 1,2 мг, амільметакрезол 0,6 мг;

*допоміжні речовини:* мед, олія м'яти перцевої, олія лимонна, кислота винна, хіноліновий жовтий (E 104), сахарози розчин, глюкози розчин.

**Лікарська форма.** Льодяники.

Округлі льодяники жовтого кольору з тисненням знаку «S» з обох боків.

#### Назва і місцезнаходження виробника.

Реккіт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед, Тейн Роуд, Ноттінгем, NG90 2DB, Велика Британія.

**Фармакотерапевтична група.** Препарати, що застосовуються при захворюваннях горла. Антисептики. Код АТС R02A A20.

Препарат має антисептичні властивості, активний відносно широкого спектра грампозитивних та грамнегативних мікроорганізмів *in vitro*; чинить також протигрибкову дію. Ефективність препарату зумовлена наявністю двох антибактеріальних компонентів широкого спектра дії, що полегшують біль у горлі та зменшують прояви запалення. Амільметакрезол руйнує структуру білків бактерій, що проявляється бактерицидною дією. 2,4-дихлорбензиловий спирт виявляє бактериостатичну дію за рахунок зневоднення бактеріальної клітини.

У зв'язку з незначною абсорбцією у кров препарат належить до засобів місцевого застосування. Враховуючи це, фармакокінетичні показники не визначалися.

#### Показання для застосування.

Симптоматичне лікування інфекційно-запальних захворювань ротової порожнини та глотки.

**Протипоказання.** Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

#### Належні заходи безпеки при застосуванні.

Не слід перевищувати зазначену максимальну дозу.

Якщо симптоми тривають протягом 3 днів, супроводжуються високою температурою, головним болем та іншими явищами, необхідно звернутися до лікаря для додаткового коригування схеми лікування.

Не рекомендується застосовувати пацієнтам зі спадковою непереносимістю фруктози та недостатністю глюкози-галактози або сахарози-ізомальтози.

Хворі на цукровий діабет мають враховувати, що 1 льодяник містить близько 2,6 г цукру.

#### Особливі застереження.

**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Безпека при застосуванні препарату у період вагітності або годування груддю не встановлювалась, але не очікується виникнення ризику у ці періоди. Незважаючи на це, усі лікарські засоби, що застосовуються у період вагітності або годування груддю, слід застосовувати з обережністю.

***Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.***

Не впливає на здатність керувати автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

***Діти.*** Враховуючи лікарську форму, не рекомендується застосовувати дітям до 6 років.

**Спосіб застосування та дози.**

Рекомендується дорослим і дітям від 6 років по 1 льодянику кожні 2-3 години. Льодяник необхідно розсмоктувати до його повного розчинення. Не застосовувати більше 12 льодяників протягом 24 годин. Тривалість лікування визначає лікар індивідуально залежно від перебігу та клінічної картини захворювання. Не потрібно коригувати дозу пацієнтам літнього віку.

**Передозування.**

Випадкове чи навмисне передозування препарату може проявлятися лише симптомами дискомфорту з боку травного тракту. У такому випадку слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря. Лікування симптоматичне.

**Побічні ефекти.**

Рідко можуть виникати реакції гіперчутливості, свербіж, висипання на шкірі, кропив'янка, еритема, стоматит, відчуття печіння, пощипування чи болю у роті, набряк та біль губ, язика чи горла, глосит, глосодинія. Дуже рідко – диспепсія та нудота.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Клінічно значуща взаємодія невідома.

**Термін придатності.** 2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.**

Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 12 льодяників у блістері; по 2 блістери в картонній коробці.