

**ІНСТРУКЦІЯ**  
для медичного застосування препарату

**КУПЛАТОН**  
(CUPLATON)

**Склад лікарського засобу:**

1 мл (1 мл = 35 крапель) містить 300 мг диметикону;

*допоміжні речовини:* кремнію діоксид колоїдний безводний, кислота сорбінова, сахарин натрію, вода очищена, гліцерол моностеарат, поліоксіетилен 100 стеарат.

**Лікарська форма.** Краплі оральні.

Емульсія білого або жовтуватого кольору.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

Оріон Корпорейшн/Orion Corporation.

Оріонінтіе 1, 02200 Еспоо, Фінляндія/Orionintie 1, 02200 Espoo, Finland.

**Фармакотерапевтична група.** Препарати, що застосовуються при функціональних гастроінтестинальних розладах. Код АТСА03А Х13.

Диметикон є поверхнево-активним полісилоксаном. Він зменшує поверхневий натяг бульбашок газу, викликає їх руйнування і сприяє виведенню газу.

При пероральному застосуванні диметикон зменшує метеоризм, спричинений різними факторами, послаблює здуття та біль у животі.

Диметикон не абсорбується зі шлунково-кишкового тракту. Він виділяється у незміненому вигляді з фекаліями.

**Показання для застосування.**

Симптоматичне лікування при скаргах з боку шлунково-кишкового тракту, пов'язаних з газоутворенням, наприклад, метеоризм.

Як допоміжний засіб при проведенні діагностичних досліджень органів черевної порожнини (рентгенографія, ультразвукове дослідження, гастродуоденоскопія).

Посилене газоутворення після хірургічних втручань.

Як піногасник при інтоксикації миючими засобами.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до диметикону або до будь-якої з допоміжних речовин препарату. Кишкова непрохідність, обструктивні захворювання шлунково-кишкового тракту.

**Особливі застереження.**

**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Диметикон не абсорбується з травного тракту, не проникає через плацентарний бар'єр та у грудне молоко.

Препарат можна застосовувати у період вагітності або годування груддю.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.**

Диметикон не впливає на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

**Діти.**

Препарат застосовують у педіатричній практиці.

**Спосіб застосування та дози.**

Перед застосуванням збовтати!

1 мл (1 мл = 35 крапель) містить 300 мг диметикону.

Для лікування метеоризму.

*Дітям віком до 10 років:*

*Вік*

*Доза*

Для лікування здуття кишечника  
(кишкової коліки), пов'язаного з  
метеоризмом у дітей від 0 до 6 місяців

По 4 краплі, змішуючи з невеликою  
кількістю рідини, перед кожним прийомом  
їжі

Від 6 місяців до 1 року

По 1 краплі 4 рази на добу

По 1-2 краплі 4 рази на добу

2-4 роки

По 2 краплі 4 рази на добу

4-6 років

По 3 краплі 4 рази на добу

6-10 років

По 4 краплі 4 рази на добу

---

*Дорослим та дітям віком від 10 років: по 5 крапель 4 рази на добу.*

Для підготовки до рентгенологічного або ультразвукового дослідження.

*Дорослим:* по 12 крапель після прийому їжі 3 рази на добу перед проведенням дослідження та 12 крапель вранці в день обстеження.

Для підготовки до гастродуоденоскопії.

*Дорослим та дітям віком від 10 років:* протягом 2-3 днів перед обстеженням, по 12 крапель 4 рази на добу.

При підвищеному газоутворенні в післяопераційному періоді.

*Дорослим:* по 12 крапель кожні 4-6 годин, за необхідності дозу треба підвищити.

Отруєння миючими засобами.

У випадку отруєння миючими засобами дозування залежить від тяжкості інтоксикації. Мінімальна рекомендована доза препарату Куплатон– 1 мл.

Тривалість лікування залежить від наявності скарг та вирішується лікарем індивідуально. При необхідності препарат можна приймати протягом тривалого часу.

### **Передозування.**

Про випадки передозування не повідомлялося.

### **Побічні ефекти.**

Побічні реакції на лікарський засіб не спостерігалися, але можливе виникнення алергічних реакцій, включаючи свербіж, гіперемію, висип та кропив'янку.

### **Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Антациди, що містять алюмінію гідроксид і магнію карбонат, адсорбують силікони і можуть знижувати ефективність диметикону. Диметикон може збільшувати абсорбцію варфарину і дигоксину.

### **Термін придатності.** 3 роки.

Використати протягом 3 місяців після розкриття флакона.

### **Умови зберігання.**

Зберігати при температурі не вище 25 °С в захищеному від світла місці.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

### **Упаковка**

По 30 мл крапель у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці.

### **Категорія відпуску.** Без рецепта.