

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**

**ЕТОНІЙ**

**Склад лікарського засобу:**

*діюча речовина:* 1 г мазі містить етонію 10 мг;

*допоміжні речовини:* ланолін, парафін білий м'який, вода очищена.

**Лікарська форма.** Мазь.

Густа однорідна маса світло-жовтого кольору.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ПАТ «Лубнифарм».

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Петровського, 16.

**Фармакотерапевтична група.**

Антисептичні та дезінфекційні засоби. Сполуки четвертинного амонію. Код АТСD08A J.

Етоній чинить бактеріостатичну та бактерицидну дію, зумовлену порушенням процесів синтезу клітинної оболонки стрептококів, стафілококів. Чинить також легку місцевоанестезуючу і ранозагоювальну дію. Сприяє регенерації пошкоджених тканин. Чинить детоксикуючу дію щодо стафілококового токсину.

**Показання для застосування.**

Трофічні виразки шкіри, тріщини сосків, прямої кишки та промежини, вагініт, опіки (термічні, хімічні, променеві та слизових оболонок), рентгенівські дерматити.

**Протипоказання.**

Підвищена індивідуальна чутливість до препарату (алергічний дерматит, екзема); алергічні реакції на компоненти препарату, гнійні і гангренозні форми пульпітів.

**Належні заходи безпеки при застосуванні**

Не допускати потрапляння препарату в очі.

**Особливі застереження.**

**Застосування в період вагітності або годування груддю.**

Немає жодних підстав вважати, що застосування препарату у період вагітності є ризикованим. Протягом вагітності препарат слід застосовувати за призначенням лікаря.

При застосуванні для лікування тріщин сосків протягом годування груддю препарат слід змити перед годуванням.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.**

Не впливає.

**Діти.**

Досвід застосування Етонію дітям відсутній.

**Спосіб застосування та дози.**

Застосовують зовнішньо.

Для лікування трофічних виразок і опіків препарат наносять безпосередньо на ушкоджену поверхню і накладають стерильну пов'язку або мазь накладають на пов'язку, а потім її – на рану.

Препарат наносять на уражені ділянки шкіри дорослим 1-2 рази на добу. Тривалість курсу лікування – від 3 днів до 1 місяця.

**Передозування.**

Інформація про передозування відсутня.

**Побічні ефекти.**

Можливі гіперемія шкіри, свербіж, алергічні реакції.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

При одночасному застосуванні з антибіотиками групи тетрациклінів, гентаміцином сульфатом, левоміцетином посилюється дія антибіотиків.

**Термін придатності.** 2 роки.

**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 15 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 15 г у банках № 1 або тубах № 1.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.