

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

АСІНІС[®]
(ASINIS)

Склад лікарського засобу:

100 мл препарату містить: *діючі речовини*: Armoracia D1 10 мл, Kalium bichromicum D6 10 мл, Hydrastis D6 10 мл, Calcium sulfuricum D12 10 мл, Cinnabaris D12 10 мл;
допоміжні речовини: етанол 43 % (м/м);
1 мл розчину містить 25 крапель.

Лікарська форма. Краплі оральні.

Прозора від безбарвного до ледь жовтуватого кольору рідина.

Назва і місцезнаходження виробника.

Ріхард Бітнер АГ,
Оссіахерштрассе 7, А-9560 Фельдкірхен, Австрія.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний засіб.

Препарат має системну лікувальну дію, зумовлену поєднанням та взаємним посиленням активних компонентів. Чинить протизапальну, проти набрякову, секретолітичну та секретомоторну дію, а також імуномодуючий та репаративний ефекти.

Препарат швидко зменшує виразність місцевих ексудативних проявів, усуває набряк і гіперемію слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, не спричиняючи подразнення, реактивної гіперемії або відчуття сухості у носовій порожнині. Покращує кількісні (об'єм продукції) та якісні (фізико-хімічні) характеристики секрету, сприяє розрідженню та більш ефективному відходженню патологічно густого слизу. Відновлює функціонування мукоциліарного кліренсу. Покращує обмінні процеси та забезпечує більш швидке очищення слизової оболонки від слизо-гнійного виділення та кірок, прискорює процеси загоєння. Посилює резистентність слизової оболонки до проникнення патогенних бактерій і вірусів. Знижує ризик розвитку гнійних ускладнень гострого катарального риносинуситу.

Покращує результати антибактеріальної терапії та зменшує необхідність у проведенні пункцій при гнійному синуситі. Не викликає звикання або ослаблення лікувального ефекту, навіть при тривалому лікуванні.

Забезпечує швидке усунення астеничного симптомокомплексу і інфекційно-токсичного та гіпоксичного генезу. Стимулює індивідуальні компенсаторні можливості організму, підвищує неспецифічну реактивність організму до інфекцій та запобігає повторним загостренням синуситу, риніту, ларинготрахеїту.

Показання для застосування.

Гострі та хронічні риносинусити (гайморити, фронтити, етмоїдити, сфеноїдити, комбіновані синусити). Хронічні риніти та ларинготрахеїти. У комплексному лікуванні запальних захворювань середнього вуха (у т. ч. середнього отиту, евстахіїту).

Протипоказання. Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

На початку лікування можливе посилення секретії у вигляді серозно-мукозних виділень (первинна відповідь). Це свідчить про дію препарату, ефективне дренування принососих пазух, носової порожнини та спорожнення їх від слизу, що накопичився. Можливе короткочасне незначне посилення симптомів захворювання є сприятливою ознакою та не потребує відміни або корекції дози препарату.

Завдяки системній дії препарату АСІНІС[®] ризик розвитку ларингоспазму у дітей відсутній. Відсутність покращання протягом 5-7 днів самостійного лікування свідчить про можливе неправильне застосування препарату, у цьому випадку Вам необхідно звернутися до лікаря за додатковою консультацією.

Оскільки АСІНІС[®] містить рослинні та інші природні компоненти, при зберіганні може спостерігатися незначна зміна смаку, прозорості або кольору розчину, що не призводить до зниження ефективності препарату.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Інформація щодо будь-якого ризику від застосування препарату у період вагітності або годування груддю дотепер не зареєстрована. Препарат застосовують у період вагітності або годування груддю лише у випадках, якщо, на думку лікаря, очікувана користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Незважаючи на вміст спирту, препарат у рекомендованих дозах не впливає на здатність керувати транспортними та механічними засобами.

Діти.

Лікарський засіб призначають дітям від 3 років.

Досвід застосування дітям до 3 років в цей час відсутній.

Спосіб застосування та дози.

Дорослі та діти від 12 років: по 10 крапель препарату у чистому вигляді або розведеного в 1 столовій ложці води;

діти 5-12 років: по 5-7 крапель препарату, розведених в 1 столовій ложці води;

діти 3-4 років: по 3-4 краплі препарату, розведених в 1 столовій ложці води.

Приймати 3 рази на добу.

На початку лікування, а також у випадках, що вимагають швидкого ослаблення симптомів, можливий прийом препарату кожні півгодини-годину до 8 разів на добу до покращання стану, але не більше 3-х діб, після чого застосовувати 3 рази на добу.

Для досягнення максимального ефекту АСІНІС[®] рекомендується застосовувати у проміжках між прийомами їжі (за 30 хвилин до або через 1 годину після їди).

Для посилення ефективності рекомендується потримати препарат деякий час у роті перед проковтуванням.

Курс лікування.

При гострому риносинуситі основний курс лікування – 1-2 тижні.

Лікування хронічного риніту, синуситу або ларинготрахеїту залежно від перебігу та тривалості захворювання – 1-2 місяця.

Профілактика загострень хронічного синуситу або ларинготрахеїту у періоди підвищення захворюваності на гостру респіраторну вірусну інфекцію або грип – 1-1,5 місяця.

При необхідності курс можна повторити (після консультації з лікарем).

Передозування. Випадків передозування не було зареєстровано.

Побічні ефекти.

Не виявлені. У виняткових випадках в осіб з гіперчутливістю на будь-який компонент препарату можливе виникнення алергічних реакцій.

Взаємодія з лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Препарат можна комбінувати з будь-якими лікарськими засобами та методами лікування.

При застосуванні АСІНІСУ[®] у комплексній терапії разом з іншими препаратами рекомендовано дотримуватися 20-хвилинної перерви між прийомом лікарських засобів.

Термін придатності. 5 років.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Лікарський засіб зберігати у щільно закритому флаконі в оригінальній картонній упаковці при температурі не вище 30 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 20 або 50, або 100 мл у флаконах-крапельницях із темного скла, у картонній упаковці.

Категорія відпуску. Без рецепта.