

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ГЕПАРИНОВА МАЗЬ
(HEPARINI UNGUENTUM)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 г мазі містить гепарину натрію 100 ОД, бензокаїну 40 мг;

допоміжні речовини: парафін білий м'який, олія соняшникова олія кукурудзяна, бензилнікотинат, гліцерин, емульгатор Т-2, метилпарагідроксibenзоат (Е 218), вода очищена

Лікарська форма. Мазь.

Мазь від білого до білого з жовтуватим відтінком кольору

Назва і місцезнаходження виробника.

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».

Україна, 10014, м. Житомир, вул. Лермонтовська, 5.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при варикозному розширенні вен. Гепарин, комбінації. Код АТС С05В А53.

Гепаринова мазь – антикоагулянт прямої дії чинить протизапальну та місцеву знеболювальну дію, запобігає утворенню тромбів, сприяє розсмоктуванню утворених тромбів.

Показання для застосування.

Профілактика та лікування тромбофлебіту поверхневих вен, постін'єкційний та постінфузійний флебіт, зовнішній геморой, запалення післяпологових гемороїдальних вузлів, трофічні виразки гомілки, слоновість, поверхневий перифлебіт, лімфангіт, поверхневий мастит, локалізовані інфільтрати та набряки, травми та удари без порушення цілісності шкірних покривів (у тому числі м'язових тканин, сухожиль, суглобів).

Протипоказання.

Гіперчутливість до будь-якого з компонентів препарату. Виразково-некротичні процеси, травматичне порушення цілісності шкірних покривів, геморагічний діатез, пурпура, тромбоцитопенія, гемофілія, схильність до кровотеч.

Належні заходи безпеки при застосуванні. При тромбоцитопенії та підвищеній схильності до кровотеч препарат застосовувати під контролем лікаря

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Не застосовувати препарат у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Не застосовувати.

Спосіб застосування та дози.

Препарат застосовувати дорослим місцево.

При тромбофлебіті поверхневих вен кінцівок мазь нанести на зону ураження тонким шаром (із розрахунку 0,5-1 г (2-4 см мазі) на ділянку діаметром 35 см) та обережно втирати у шкіру 2-3 рази на добу протягом 3-7 діб до зникнення явищ запалення. Можливість проведення тривалішого курсу лікування визначає лікар.

При тромбозі гемороїдальних вен мазь нанести на серветку з тканини, яку застосовувати безпосередньо на гемороїдальні вузли та зафіксувати пов'язкою (можливе застосування тампону з нанесеною на нього маззю, який вводити у задній прохід) 2-3 рази на добу до зникнення ознак запалення, в середньому 3-14 діб. Можливість тривалішого застосування визначає лікар індивідуально.

Передозування.

Через низький рівень всмоктування Гепаринової мазі її передозування є неможливим.

Побічні ефекти.

Почервоніння, висипи на шкірі, кропив'янка, ангіоневротичний набряк, геморагії, іноді можливе виникнення невеликих пустул, пухирців або пухирів. Можлива місцева подразнювальна дія, що проявляється у вигляді печіння, свербіжжю або невеликого набряку шкіри. При нанесенні на великі ділянки шкіри можливі системні алергічні реакції.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Дію мазі посилюють антикоагулянти, ацетилсаліцилова кислота та інші нестероїдні протизапальні засоби. Ефективність мазі послаблюють препарати наперстянки, тетрацикліни, нікотин, антигістамінні препарати. Застосування гепарину може сприяти подовженню протромбінового часу у хворих, які застосовують пероральні антикоагулянти. Не слід застосовувати препарат разом із лікарськими засобами для місцевого застосування, наприклад з препаратами, що містять тетрациклін, гідрокортизон, саліцилову кислоту, з антикоагулянтами.

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі 8-20 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 25 г у тубі в пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування препарату **ГЕПАРИНОВА МАЗЬ** **(HEPARINI UNGUENTUM)**

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 г мазі містить гепарину натрію 100 ОД, бензокаїну 40 мг;

допоміжні речовини: парафін білий м'який, олія соняшникова олія кукурудзяна, бензилнікотинат, гліцерин, емульгатор Т-2, метилпарагідроксибензоат (Е 218), вода очищена

Лікарська форма. Мазь.

Мазь від білого до білого з жовтуватим відтінком кольору

Назва і місцезнаходження виробника.

ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».

Україна, 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка,

4.

вул. Корольова, б.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при варикозному розширенні вен. Гепарин, комбінації. Код АТС С05В А53.

Гепаринова мазь – антикоагулянт прямої дії чинить протизапальну та місцеву знеболювальну дію, запобігає утворенню тромбів, сприяє розсмоктуванню утворених тромбів.

Показання для застосування.

Профілактика та лікування тромбофлебиту поверхневих вен, постін'єкційний та постінфузійний флебіт, зовнішній геморої, запалення післяпологових гемороїдальних вузлів, трофічні виразки гомілки, слоновість, поверхневий перифлебіт, лімфангіт, поверхневий мастит, локалізовані інфільтрати та набряки, травми та удари без порушення цілісності шкірних покривів (у тому числі м'язових тканин, сухожиль, суглобів).

Протипоказання.

Гіперчутливість до будь-якого з компонентів препарату. Виразково-некротичні процеси, травматичне порушення цілісності шкірних покривів, геморагічний діатез, пурпура, тромбоцитопенія, гемофілія, схильність до кровотеч.

Належні заходи безпеки при застосуванні. При тромбоцитопенії та підвищеній схильності до кровотеч препарат застосовувати під контролем лікаря

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Не застосовувати препарат у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Не застосовувати.

Спосіб застосування та дози.

Препарат застосовувати дорослим місцево.

При тромбофлебіті поверхневих вен кінцівок мазь нанести на зону ураження тонким шаром (із розрахунку 0,5-1 г (2-4 см мазі) на ділянку діаметром 35 см) та обережно втирати у шкіру 2-3 рази на добу протягом 3-7 днів до зникнення явищ запалення. Можливість проведення тривалішого курсу лікування визначає лікар. При тромбозі гемороїдальних вен мазь нанести на серветку з тканини, яку застосовувати безпосередньо на гемороїдальні вузли та зафіксувати пов'язкою (можливе застосування тампону з нанесеною на нього маззю, який вводити у задній прохід) 2-3 рази на добу до зникнення ознак запалення, в середньому 3-14 днів. Можливість тривалішого застосування визначає лікар індивідуально.

Передозування.

Через низький рівень всмоктування Гепаринової мазі її передозування є неможливим.

Побічні ефекти.

Почервоніння, висипи на шкірі, кропив'янка, ангіоневротичний набряк, геморагії, іноді можливе виникнення невеликих пустул, пухирців або пухирів. Можлива місцева подразнювальна дія, що проявляється у вигляді печіння, свербіжжю або невеликого набряку шкіри. При нанесенні на великі ділянки шкіри можливі системні алергічні реакції.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Дію мазі посилюють антикоагулянти, ацетилсаліцилова кислота та інші нестероїдні протизапальні засоби. Ефективність мазі послаблюють препарати наперстянки, тетрацикліни, нікотин, антигістамінні препарати. Застосування гепарину може сприяти подовженню протромбінового часу у хворих, які застосовують пероральні антикоагулянти. Не слід застосовувати препарат разом із лікарськими засобами для місцевого застосування, наприклад з препаратами, що містять тетрациклін, гідрокортизон, саліцилову кислоту, з

антикоагулянтами.

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі 8-20 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 25 г у тубі в пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.